

2.2 Stoornissen volgens de DSM-IV

De DSM is gebaseerd op consensus van Amerikaanse psychiaters. Om de 5 à 10 jaar wordt tijdens een grote vergadering besloten of diagnoses worden gewijzigd, of verwijderd, of dat nieuwe diagnoses worden toegevoegd. Dat leidt dan weer tot een nieuwe versie van het handboek.

- De DSM wordt standaard gebruikt in internationaal psychiatrisch onderzoek.
- In de gespecialiseerde GGZ in Nederland wordt de DSM in de dagelijkse praktijk ook vrijwel standaard gebruikt voor het stellen van diagnoses.
- Een belangrijk nadeel is wel dat in de somatische gezondheidszorg en in de eerstelijnszorg vooral wordt gewerkt met een ander diagnostisch systeem: de International Classification of Diseases (ICD-10) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Pervasive ontwikkelingsstoornissen

Pervasive development disorders

299.00 Autistische (spectrum) Stoornis (AS /ASS)

299.80 Stoornis van Asperger

299.80 Pervasive Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven
Pervasive developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS/PDD-NAO)

(Soms met de toevoeging: van het type M.C.D.D. = Multiple Complex Developmental Disorder)

Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen

Attention-Deficit and Disruptive Behavior disorders

314.xx Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit
Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

312.81 Gedragsstoornis (type beginnend in de kinderleeftijd)
Conduct Disorder (CD)

313.81 Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis
Oppositional Defiant Disorder (ODD)

TIC-stoornissen

307.23 Stoornis van Gilles de la Tourette