

## 2.2 Stoornissen volgens de DSM-IV

De DSM is gebaseerd op consensus van Amerikaanse psychiaters. Om de 5 à 10 jaar wordt tijdens een grote vergadering besloten of diagnoses worden gewijzigd, of verwijderd, of dat nieuwe diagnoses worden toegevoegd. Dat leidt dan weer tot een nieuwe versie van het handboek.

- De DSM wordt standaard gebruikt in internationaal psychiatrisch onderzoek.
- In de gespecialiseerde GGZ in Nederland wordt de DSM in de dagelijkse praktijk ook vrijwel standaard gebruikt voor het stellen van diagnoses.
- Een belangrijk nadeel is wel dat in de somatische gezondheidszorg en in de eerstelijnszorg vooral wordt gewerkt met een ander diagnostisch systeem: de International Classification of Diseases (ICD-10) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

### Pervasive ontwikkelingsstoornissen

#### *Pervasive development disorders*

- 299.00      Autistische (spectrum) Stoornis (AS /ASS)
- 299.80      Stoornis van Asperger
- 299.80      Pervasive Ontwikkelingsstoornis Niet Anderszins Omschreven  
*Pervasive developmental Disorder Not Otherwise Specified (PDD-NOS/PDD-NAO)*

(Soms met de toevoeging: van het type M.C.D.D. = Multiple Complex Developmental Disorder)

### Aandachtstekortstoornissen en gedragsstoornissen

#### Attention-Deficit and Disruptive Behavior disorders

- 314.xx      Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit  
*Attention-deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)*
- 312.81      Gedragsstoornis (type beginnend in de kinderleeftijd)  
*Conduct Disorder (CD)*
- 313.81      Oppositioneel-opstandige gedragsstoornis  
*Oppositional Defiant Disorder (ODD)*

### TIC-stoornissen

- 307.23      Stoornis van Gilles de la Tourette